

Plantonit Berry (Ягода)



Plantonit Berry* – високоефективне, комплексне добриво для підживлення ягідних культур. Розроблене з метою підвищення урожайності та покращення якості плодів. Добриво забезпечує потребу в елементах живлення протягом всього вегетаційного періоду, сприяє правильному розвитку та якісним показникам врожаю, підвищує стійкість до захворювань та шкідників. Може застосовуватись на всіх ягідних культурах як універсальне добриво.

* **Berry** – (від лат.) - Ягода.

Дія і вплив добрива:

- Збільшує врожайність
- Посилює ростові процеси
- Збільшує вироблення хлорофілу
- Стимулює цвітіння та запилення
- Стимулює обмін речовин в рослині
- Значно знижує накопичення нітратів
- Збільшує цукристість, вміст вітамінів
- Уповільнює старіння листя та бадилля
- Виконує функцію підтримки росту плодів
- Підвищує стійкість рослин до стресових ситуацій
- Покращує якість плодів і продовжує терміни їх зберігання
- Стимулює вегетативний ріст а також зміцнює молоді пагони і листя

Хімічний склад та властивості:

Склад:

1	Органічний вуглець (C)	8 %	12	P2O5	100 г/л
2	Вітамінний комплекс	B1, B6, D, H, PP – 0,04 %	13	K2O	100 г/л
3	Протеїнові поліпептиди	8 %	14	*MgO	10 г/л
4	ГІФ кислоти	6 %	15	SO3	8 г/л
5	Амінокислоти	2 г/л	16	B	10 г/л
6	Фітогормони	2 г/л	17	*Fe	6 г/л
7	Бетаїн	1000 ppm/л	18	*Mn	5 г/л
8	Хітозан	100 ppm/л	19	*Cu	5 г/л
9	ПАР	3%	20	*Zn	6 г/л
10	Йод	0,1%	21	*Mo	1 г/л
11	N	80 г/л	*Елемент в хелатній формі EDTA		

рН –

Густина –

Препаративна форма - Концентрат суспензії

Тарна одиниця: 0,5; 1л; 5л.



Рекомендовані норми витрати Плантоніт Ягода:

Культура	Фаза росту і розвитку	Норма витрати, л/га
Виноград	Цвітіння (ВВСН 61-69)	1
	Ріст ягід (ВВСН 71-79) (з інтервалом 7-10 днів)	2
Смородина	Початок цвітіння (ВВСН 61-64)	2
	Кінець цвітіння (ВВСН 65-69) (з інтервалом 7-10 днів)	2
Агрис	Початок цвітіння (ВВСН 61-64)	2
	Кінець цвітіння (ВВСН 65-69)	2
	До збору врожаю (ВВСН 71-89)	2
Малина	Початок цвітіння (ВВСН 61-64)	2
	Кінець цвітіння (ВВСН 65-69) (з інтервалом 7-10 днів)	2
Полуниця	Початок цвітіння (ВВСН 61-64)	2
	Кінець цвітіння (ВВСН 65-69) (з інтервалом 7-10 днів)	2
Лохина	Обробіток по вегетації (з інтервалом 7-10 днів)	2
Ожина	Обробіток по вегетації (з інтервалом 7-10 днів)	2
Журавлина	Обробіток по вегетації (з інтервалом 7-10 днів)	2

ГАРАНТУЄМО МОЖЛИВЕ!