

Plantonit BioGumate (БіоГумат)



Plantonit BioGumate* – комплексний природно-енергетичний препарат контактно-системної дії для підсилення росту, розвитку та підвищення врожайності рослин. Використовується для обробки насіння і для позакореневої обробки рослин.

Гумінові речовини збільшують катіоно-обмінну здатність ґрунту, покращуючи структуру ґрунту і підвищуючи здатність ґрунту забезпечувати рослину необхідними поживними речовинами. Гумінові речовини також викликають електрохімічний потенціал в коренях, що сприяє засвоєнню поживних речовин. Через збільшення виробництва фенольних сполук, гумінові речовини підвищують стійкість до стресів рослини..

*** BioGumate** – (від лат.) - БіоГумат.

Дія і вплив добрива:

- поліпшення якості врожаю
- повноцінно підживлює рослину
- активує ріст та розвиток рослини
- прискорює утворення гумусу в ґрунті
- підвищує якість та класність с/г культур
- стимулює розвинення кореневої системи
- посилення діяльності корисної мікрофлори
- підвищує стійкість с/г культур до збудників захворювань

Хімічний склад та властивості:

Склад:

1	ГіФ кислоти	10 %	10	*MgO	15 г/л
2	Амінокислоти	2 г/л	11	SO3	10 г/л
3	Фітогормони	2 г/л	12	B	5 г/л
4	Бетаїн	1000 ppm/л	13	*Fe	5 г/л
5	Хітозан	100 ppm/л	14	*Mn	5 г/л
6	ПАР	3%	15	*Cu	5 г/л
7	N	20 г/л	16	*Zn	5 г/л
8	P2O5	20 г/л	17	*Mo	0,5 г/л
9	K2O	20 г/л	*Елемент в хелатній формі EDTA		

рН –

Густина –

Препаративна форма - Концентрат суспензії

Тарна одиниця: 1л, 10л, 20л.

Рекомендовані норми витрати Плантоніт BioGumate:

Культури	Фаза росту та розвитку	Норма витрат, л/га
Зернові колосові	Кущення (ВВСН 21-29)	2-3
	Вихід в трубку – прапорцевий листок (ВВСН 30-49)	2-3
Соняшник	2-3 пари листків (4-6 листків) (ВВСН 14-16)	2-3
	5-6 пар листків (10-12 листків) (ВВСН 30-33)	2-3
Соя, горох	3-5 трійчастих листків (ВВСН 14-16)	2-3
	Бутонізація – початок цвітіння (ВВСН 51-61)	2-3
Кукурудза	3-5 справжніх листків в (ВВСН 13-15)	2-3
	6-8 листків (ВВСН 16-18)	2-3
Ріпак	Весняна розетка – стеблуння (ВВСН 21-39)	2-3
	Бутонізація (перед цвітінням) (ВВСН 50-61)	2-3
Цукрові буряки	4-6 листків (ВВСН 14-16)	2-3
	Змикання листків в рядках (ВВСН 19-34)	2-3
	Змикання листків в міжряддях (ВВСН 35-39)	2-3
Картопля	Стеблуння (ВВСН 21-39)	2-3
	Бутонізація (ВВСН 51-59)	2-3
Томати, перець, баклажани	Обробка у фазі 2-4 справжніх листків (ВВСН 12-16)	2-3
	Початок цвітіння – дозрівання плодів (ВВСН 61-89) (з інтервалом 7-10 днів)	2-3
Огірки	Сходи – 3-6 справжніх листків (ВВСН 13-16)	2-3
	Плодоношення (ВВСН 71-89) (обробка з інтервалом 7-10 днів)	2-3
Морква	4-6 справжніх листків (ВВСН 14-16) (обробка з інтервалом 7-10 днів)	2-3
Цибуля, часник	3-6 справжніх листків (ВВСН 14-16) (обробка з інтервалом 7-10 днів)	2-3
Капуста	2-3 справжніх листків (ВВСН 12-13)	2-3
	Формування качана (ВВСН 41-49)	2-3
	Кінець цвітіння (ВВСН 65-69)	2-3
Виноград	Обробка перед цвітінням (ВВСН 53-57)	2-3
	Обробка в період цвітіння (ВВСН 61-69)	2-3
	Ріст ягід (ВВСН 71-79) (з інтервалом 7-10 днів)	2-3

ГАРАНТУЄМО МОЖЛИВЕ!