

Plantonit LinAmin (ЛінАмін)

PlantonitLinAmin* – Комплексний антистресовий препарат для підвищення стійкості рослин до пошкоджень низькими температурами. Використовуються в якості кріопротектора перед можливими заморозками, для виведення зі стресу і відновлення активної вегетації. Також використовуються в якості антистресового препарату для підвищення стійкості рослин до посухи і пошкоджень високими температурами, стимуляції коренеутворення, покращення кількості та якості врожаю. В якості стимулятора покращує розвиток кореневої системи, підвищує кількість і якість плодів.

***LinAmin** – (від лат.) - Амінокислоти.

Дія і вплив добрива:

- розвиток кореневої системи
- подолання сольового стресу
- високоякісний біостимулятор будівельний матеріал для інших амінокислот
- толерантність до жаркої і посушливої погоди
- покращує проростання пилка та процесу запилення
- висока концентрація амінокислот і біоактивних сполук регулювання роботи листового устя в період жаркої погоди

Хімічний склад та властивості:**Склад:**

1	Вітамінний комплекс	B1, B6, D, H, PP – 0,04%
2	Амінокислоти	200 г/л
3	N	100 г/л

рН –

Густина –

Препаративна форма - Концентрат суспензії

Тарна одиниця: 1л, 10л, 20л.

Рекомендовані норми витрати ПЛАНТОНІТ ЛІНАМІН:

Культури	Фаза росту та розвитку	Норма витрат, л/га
Зернові колосові	Кінець кущення (ВВСН 21-29)	0,5
	Вихід в трубку – початок цвітіння (ВВСН 30-61)	0,5
Соняшник	2-4 пари листків (4-8 листків) (ВВСН 14-18)	0,5
	5-6 пар листків (10-12 листків) (ВВСН 33-37)	0,5
Соя, горох	3-5 трійчастих листків (ВВСН 14-16)	0,5
	Бутонізація – початок цвітіння (ВВСН 51-61)	0,5
Кукурудза	3-5 справжніх листків (ВВСН 13-15)	0,5
	6-8 справжніх листків (ВВСН 16-18)	0,5
Ріпак	Весняна розетка – стеблуння (ВВСН 21-39)	0,5
	Бутонізація (перед цвітінням) (ВВСН 50-61)	0,5
Цукрові буряки	4-6 листків (ВВСН 14-16)	0,5
	Змикання листків в рядках (ВВСН 19-34)	0,5
	Змикання листків в міжряддях (ВВСН 35-39)	0,5
	Активний ріст коренеплодів (ВВСН 39-49)	0,5
Овочі	Через кожні 10 днів	0,5

ГАРАНТУЄМО МОЖЛИВЕ!