

Plantonit Radix (Радікс)



Plantonit Radix* – рідке добриво для стимуляції росту та розвитку кореневої системи рослин. Збалансований склад, котрий спеціально розроблений для активного впливу діючих речовин на рослину. Radix допомагає на найважливіших етапах розвитку рослини. Фігуруючі елементи складу це - фосфор та фітогормони, вони забезпечують швидкий ріст та особливу стресостійкість. **Plantonit Radix** - рішуче впливає на отримання максимального врожаю.

***Radix** – (від лат.) - Корінь.

Дія і вплив добрива:

- стимулює ріст та розвиток кореневої системи
- сприяє утворенню корневих волосків
- збільшує довжину корінців та площі кореневої системи
- підвищує морозостійкість, холодостійкість, посухостійкість і жаростійкість
- за допомогою натуральних фітогормонів та амінокислот добриво забезпечує найсильнішу стійкість до різного роду стресів, особливо посухи
- Є енергетичним донором, стимулюючим проходження всіх біохімічних процесів характерних для кожного періоду обробки.

Хімічний склад та властивості:

Склад:

1	Органічний вуглець (C)	8 %	12	P2O5	250 г/л
2	Вітамінний комплекс	B1, B6, D, H, PP – 0,04 %	13	K2O	60 г/л
3	Протеїнові поліпептиди	8 %	14	*MgO	70 г/л
4	ГіФ кислоти	5 %	15	SO3	20 г/л
5	Амінокислоти	4 г/л	16	B	5 г/л
6	Фітогормони	4 г/л	17	*Fe	20 г/л
7	Бетаїн	1000 ppm/л	18	*Mn	40 г/л
8	Хітозан	100 ppm/л	19	*Cu	30 г/л
9	ПАР	3%	20	*Zn	20 г/л
10	Йод	0,1%	21	*Mo	0,1 г/л
11	N	100 г/л	*Елемент в хелатній формі EDTA		

pH –

Густина –

Препаративна форма - Концентрат суспензії

Тарна одиниця: 1л, 10л, 20л.

Рекомендовані норми витрати Плантоніт Радікс:

Культури	Фаза росту та розвитку	Норма витрат, л/га
Зернові колосові	Восени: обробка фаза кущення (ВВСН 21-23)	2
	Навесні: відновлення вегетації (ВВСН 23-29)	1-2
Соняшник	2-3 пари листків (4-6 листків) (ВВСН 14-16)	1-1,5
Соя, горох	2-3 пари листків (ВВСН 14-16)	1
Кукурудза	3-5 справжніх листків в (ВВСН 13-15)	1-1,5
Ріпак	Восени: з 4 добре розвинених листків (ВВСН 10-19)	2
	Навесні: Розетка – стеблування (ВВСН 20-29)	2
Цукрові буряки	4-6 листків (ВВСН 14-16)	1,5-2
	Початок змикання рядків (ВВСН 31-33)	1,5-2
	+ 2 обробки з інтервалом 10-14 днів	1,5-2
Овочі	2-3 обробки після висадки розсади	2

ГАРАНТУЄМО МОЖЛИВЕ!